

### EC 551 : Statistique descriptive et décisionnelle

**Guillaume Franchi** 

Cursus Ingénieur 1ère année

Partie 1 : Statistique descriptive

#### Pré-requis

• Connaissances sur le logiciel R (EC 551)

#### **Bibiliographie**

- R pour la statistique et la science des données, *François Husson et al.*, Presses Universitaires de Rennes.
- Probabilités, Analyse des données et Statistique, Gilbert Saporta, Editions Technip.

#### Objectifs

- Présenter, décrire et résumer des données nombreuses et variées issues de phénomènes économiques, physiques ou biologiques.
- Mettre en œuvre des techniques d'estimation et de test afin de prendre la meilleure décision possible.

### **Enseignement**

- Partie 1 : Statistique descriptive (G. Franchi 2CMs, 4TDs).
- Partie 2 : Statistique inférentielle (M.Semenou 1CM, 12 TDs).

#### Modalités d'évaluation

- 1 évaluation écrite (2h coefficient 2) commune aux deux parties.
- 1 Projet couplé avec l'EC 552 Introduction au langage R (coefficient 1).

#### **Définition**

La **statistique** désigne à la fois un ensemble de données d'observations, et l'activité qui consiste dans

- leur recueil,
- leur traitement,
- et leur interprétation.

(Encyclopedia Universalis)

#### Remarque

En **statistique descriptive**, on s'intéressera essentiellement à résumer l'information contenue dans les données de façon synthétique et efficace :

- par des représentations graphiques;
- par des indicateurs statistiques (statistiques univariées);
- par des relations entre les variables (statistiques multivariées).


#### **Exemple**

Une enseigne de salles de sport a interrogé 973 de ces clients afin de mieux déterminer le « profil-type » des usagers. On présente ici quelques données récoltées.

	Age	Sexe	Type	Taille(m)	Poids(kg)	Volume_hebdo(h)
1	56	Feminin	Yoga	1.71	60.30	6.76
2	46	Feminin	HIIT	1.53	44.50	5.20
3	32	Masculin	Cardio	1.66	68.10	4.44
4	25	Masculin	Force	1.70	73.20	1.77
5	38	Feminin	Force	1.69	66.10	1.92
6	56	Feminin	HIIT	1.68	58.00	7.95

#### **Exemple (suite)**

• Si on s'intéresse au temps passé par les clients dans la salle de sport, on peut représenter un histogramme ou un boxplot.






- Quelques indicateurs statistiques de cette variable :
  - Moyenne : 4.375.
  - o Médiane: 4.050.
  - Quartiles :  $Q_1 = 2.760$  et  $Q_3 = 5.480$ .

#### **Exemple (suite)**


• On peut aussi s'intéresser au lien entre les deux variables catégorielles : « Sexe » et « Type ».

	Cardio	HIIT	Force	Yoga
Masculin	117	117	170	34
Feminin	138	104	88	205



#### Population vs Echantillon

- En statistique, une **population** désigne un ensemble d'**individus** ayant des propriétés communes. Ces propriétés sont décrites par des **variables**.
- L'étude de tous les individus de la population s'appelle un recensement.
- En général, un recensement de la population est impossible et on n'observe qu'une partie de la population, appelée **échantillon**.



#### Base de données

Les données recueillies en statistique se présentent toujours sous la forme d'un tableau.

- Les colonnes du tableau représentent les variables (ou caractéristiques) étudiées dans la population.
- Les lignes du tableau représentent les individus qui ont été sélectionnés dans l'échantillon.

#### **Exemple**

Dans le cas de l'enseigne de salles de sport, il serait trop long et onéreux d'interroger la totalité des clients. On se contente donc d'en interroger un échantillon de 973 personnes :

Individu	Age	Sexe	Type	Taille(m)	Poids(kg)	Volume_hebdo(h)
1	56	Feminin	Yoga	1.71	60.30	6.76
2	46	Feminin	HIIT	1.53	44.50	5.20
3	32	Masculin	Cardio	1.66	68.10	4.44
4	25	Masculin	Force	1.70	73.20	1.77
5	38	Feminin	Force	1.69	66.10	1.92

#### Types de variables

On distingue deux grandes familles de variables :

- Les variables qualitatives : elles correspondent à un ensemble de catégories (ou classes) auxquelles peut appartenir un individu.
- Les variables quantitatives : elles décrivent un individu de façon numérique, selon une échelle ordonnée.

#### Remarque

Les classes *(ou modalités)* d'une variable qualitative peuvent être codées de façon numérique. Elles ne sont pas pour autant des variables quantitatives.

#### **Echelles de mesure**

Type Variable	Type Données	Exemple
Qualitative	Nominale	Sexe, Type de sport
Qualitative	Ordinale	Niveau, noté de 1 (Débutant) à 4 (Confirmé)
Quantitative	Discrète	Nombre de séances hebdomadaires
Quantitative	Continue	Poids

#### Résumé d'une variable qualitative

Une variable qualitative peut être résumée :

- En comptant, pour chaque modalité i, l'effectif n<sub>i</sub> des individus appartenant à la modalité i.
- En calculant, pour chaque modalité *i*, la **fréquence**  $f_i$  des individus appartenant à la modalité *i*. lci

$$f_i = \frac{n_i}{N}$$

N étant l'effectif total de l'échantillon observé.

#### **Exemple**

Dans le cas des 973 clients interrogés dans des salles de sport, on peut résumer la variable « Type de sport » par le tableau :

Modalité	Effectif $n_i$	Fréquence $f_i$
Yoga	239	$\frac{239}{973} \approx 0.24$
HIIT	221	$\tfrac{221}{973}\approx 0.23$
Cardio	255	$\tfrac{255}{973}\approx 0.26$
Force	258	$\frac{258}{973} pprox 0.27$


#### Représentation graphique

Une variable qualitative peut être représentée :

- Par un diagramme en barres (barplot).
- Par un diagramme circulaire (Pie chart).

#### **Exemple**


On peut représenter la variable « Type de sport » de ces deux façons






#### Remarque

- Pour une variable qualitative ordinale, on n'utilisera que des diagrammes en barres, afin de pas perdre le caractère ordonné de la variable.
- Supposons par exemple que l'on ait classé nos 973 adhérents par niveau de 1 (Débutant) à 4 (Confirmé).





#### Représentation graphique


- Lorsque la variable est **discrète** (et avec peu de modalités), on peut procéder comme si c'était une variable qualitative ordinale.
- Lorsque la variable est **continue**, on peut la représenter :
  - par un histogramme;
  - o par un **boxplot** (boîte à moustaches).

#### Histogramme

- Un histogramme est un graphique à barres verticales accolées, obtenu après découpage en classes des observations.
- La surface de chaque barre est proportionnelle à l'effectif de la classe.

#### **Exemple**

On a représenté ci-dessous un histogramme représentant la variable « Temps hebdomadaire passé à la salle de sport » des individus observés.



#### Remarque

#### Choisir un trop grand nombre k de classe « brouille » l'information.













(c) 
$$k = 30$$



#### Remarque (suite)

La difficulté est de déterminer le nombre k de classes. Parmi les solutions courantes, on peut utiliser :

La formule de Sturges :

$$k=1+3.3\log_{10}(n)$$

où n est l'effectif total de l'échantillon.

• La formule de Yule :

$$k = 2.5 \times n^{1/4}$$
.


#### **Boxplot**

- Il s'agit une représentation synthétique efficace des principaux indicateurs statistiques d'une variable quantitative.
- Un tel diagramme fournit des indicateurs de position et de dispersion de la variable considérée.

#### **Exemple**

Si on s'intéresse au temps hebdomadaire passé par les usagers à la salle de sport, le langage R représente ainsi :

- une boîte délimitée par les quartiles Q<sub>1</sub> et Q<sub>3</sub>;
- une ligne à l'intérieur de cette boîte indiquant la médiane;
- des « moustaches » s'étendant de part et d'autre jusqu'à la dernière valeur éloignée de moins de 1.5(Q<sub>3</sub> - Q<sub>1</sub>).
- Les valeurs en-dehors de ces « moustaches » sont des outliers.



🗱 On considère dans cette section des variables quantitatives.

Les indicateurs statistiques que l'on calcule pour de telles variables sont de deux ordres :

- indicateurs de position (Moyenne, Médiane, Quartiles,...);
- indicateurs de dispersion (Ecart inter-quartiles, Variance...).

On ne peut décrire efficacement un jeu de données qu'en associant ces deux types d'indicateurs, mais ce n'est pas toujours suffisant...

4.1. Indicateurs de position

#### Moyenne arithmétique

Si on considère un échantillon de valeurs  $(x_i)_{1 \le i \le n}$ , alors la moyenne de ces valeurs est

$$\overline{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

#### **Avantages / Inconvénients**

◆ La moyenne arithmétique minimise la somme des carrés des écarts à une valeur A, i.e.

$$\overline{x} = \underset{A \in \mathbb{R}}{\operatorname{argmin}} \sum_{i=1}^{n} (x_i - A)^2.$$

Elle est très sensible aux valeurs extrêmes...

#### **Exemple**

- Si on considère 100 salariés d'une entreprise qui gagnent entre 2000€ et 4000€ bruts, on aura une moyenne comprise entre 2000 et 4000 euros brut.
- Supposons qu'on ajoute le salaire du chef d'entreprise, qui est de 1 000 000€ bruts!

La moyenne des salaires sera alors comprise entre 11 881.18 et 13 861.39 euros brut, soit une augmentation d'environ 10 000€!!!

#### Médiane

- Il s'agit d'une valeur  $\tilde{x}$  permettant de scinder un jeu de données  $(x_i)_{1 \le i \le n}$  en deux groupes de même effectif.
- Au moins la moitié des valeurs  $x_i$  sont **inférieures** ou égales à  $\tilde{x}$ ...
- ... et au moins la moitié des valeurs  $x_i$  sont **supérieures** ou égales à  $\tilde{x}$ .

Si *n* est impair, on prend la valeur centrale de la série statistique, soit la  $\frac{n+1}{2}$ -ème valeur.

 $\mathbf{x}$  Si n est pair, on prend la moyenne de la n-ème et de la n+1-ème valeur.

#### **Exemple**

Reprenons les données de salaire d'une entreprise (100 salariés + chef d'entreprise).

Salaire brut (€)	2000	2500	3000	3500	4000	1 000 000
Effectifs	50	20	15	10	5	1

- Sans le chef d'entreprise, le salaire médian est de 2250€ bruts.
- Avec le chef d'entreprise, le salaire médian est de 2500€ bruts.

#### **Avantages / Inconvénients**


♣ La médiane minimise la somme des valeurs absolues des écarts à une valeur A, i.e.

$$\widetilde{x} = \underset{A \in \mathbb{R}}{\operatorname{argmin}} \sum_{i=1}^{n} |x_i - A|.$$

- 🗘 La médiane est peu sensible aux valeurs extrêmes.
- Elle ne tient pas compte des valeurs de la série statistique, mais de leur rang : elle est donc plus sensible aux fluctuations d'échantillon que la moyenne.
- Peu pratique à calculer.

#### Remarque

- Les indicateurs de moyenne et médiane peuvent ne pas suffire pour résumer une série statistique, ou effectuer des comparaisons.
- On a représenté ci-dessous les histogrammes de deux séries statistiques.




#### Mode

- On appelle mode d'une série statistique la valeur ayant le plus grand effectif.
- Si on regroupe la série en classes, la classe modale est la classe ayant le plus grand effectif.

#### **Exemple**

Dans l'exemple précédent, on peut distinguer deux modes sur la première série, contre un seul dans la seconde.



#### **Quantiles**

- Le **quantile** d'ordre *p* d'une série statistique est la plus petite valeur *q* de la série telle qu'une proportion *p* des valeurs sont inférieur ou égale à *q*.
- On distingue en particulier :
  - les quartiles  $Q_1$  et  $Q_3$  (quantiles d'ordres 0.25 et 0.75);
  - ∘ les **déciles**  $D_1, D_2, ..., D_9$  (quantiles d'ordres 0.1, 0.2, ..., 0.9).

#### **Exemple**

• Reprenons l'exemple des salaires.

Salaire brut (€)	2000	2500	3000	3500	4000	1 000 000
Effectifs	50	20	15	10	5	1

• On a

$$Q_1 = 2000 \text{ et } Q_3 = 3000;$$

$$O_1 = 2000 \text{ et } D_9 = 3500.$$

4.2. Indicateurs de dispersion

O Un indice de dispersion permet de mesurer l'écartement des valeurs les unes par rapport aux autres, ou bien par rapport à un indice de position.

### **Etendue**

L'étendue d'une série statistique  $(x_i)_{1 \le i \le n}$  est donnée par

$$E(x) = \max_{1 \leqslant i \leqslant n} x_i - \min_{1 \leqslant i \leqslant n} x_i.$$

### **Ecarts inter-quantiles**

On peut considérer

- l'écart inter-quartiles : Q<sub>3</sub> − Q<sub>1</sub> ;
- l'écart inter-déciles :  $D_9 D_1$ .

### Variance et écart-type

• La **variance** d'une série correspond  $(x_i)_{1 \le i \le n}$  à la moyenne des carrés des écarts à la moyenne :

$$V(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2.$$

• L'écart-type est la racine carrée de la variance :

$$\sigma(x) = \sqrt{V(x)}.$$

 Plus ces indices sont grands, plus les valeurs de la série sont dispersées autour de la moyenne.

### **Avantages / Inconvénients**

- Faciles à calculer.
- Sensibles aux valeurs extrêmes...

### **MAD**

Le **MAD** d'une série  $(x_i)_{1 \le i \le n}$  correspond à la médiane des écarts absolus à la médiane :

$$MAD(x) = Med(|x_i - \widetilde{x}|)_{1 \leqslant i \leqslant n}.$$

### **Avantages / Inconvénients**

- Peu sensible aux valeurs extrêmes.
- Peu pratique à calculer.

### Valeurs atypiques

Plusieurs critères permettent de considérer certaines valeurs d'une série  $(x_i)_{1 \le i \le n}$  comme atypiques *(outliers)*.

On considère souvent une valeur  $x_i$  comme atypique si :

- $x_i > Q_3 + 1.5(Q_3 Q_1)$  ou  $x_i < Q_1 1.5(Q_3 Q_1)$ ;
- ou bien  $|x_i \overline{x}| > 3\sigma(x)$ ;
- ou bien  $|x_i \widetilde{x}| > 4.45 \times MAD(x)$ .

- On considère à nouveau les 973 clients de la salle de sport interrogés sur leur volume d'entraînement hebdomadaire *(en heures)*.
- On a calculé différents indicateurs statistiques de cette série, nommée Vol, avec
   R :

```
# Moyenne
mean(Vol)
# Médiane
median(Vol)
# Quartiles Q1 et Q3
quantile(Vol,probs = c(0.25,0.75))
# MAD
mad(Vol,constant = 1)
# Variance et Ecart-type
var(Vol)*972/973
sd(Vol)*sqrt(972/973)
```

### **Exemple (suite)**

On obtient alors


```
\odot \overline{x} = 4.374985 \odot Q_1 = 2.76; Q_3 = 5.48 \odot V(x) = 4.739766 \odot X = 4.05 \odot AD(x) = 1.35 \odot G(x) = 2.1771
```

- Un individu peut donc être considéré comme un outlier si son volume horaire d'entraînement :
  - n'appartient pas à l'intervalle [-1.32; 9.56] (critère inter-quartiles);
  - o n'appartient pas à l'intervalle [-1.9575; 10.0575] (critère MAD);
  - o n'appartient pas à l'intervalle [-2.1529; 10.90293] (critère écart-type).

# 5.1 Lien entre deux variables quantitatives

Considérons deux séries  $(x_i)_{1 \le i \le n}$  et  $(y_i)_{1 \le i \le n}$  correspondant à deux variables quantitatives observées dans un échantillon de taille n.

On peut représenter graphiquement un potentiel lien entre les deux variables par un **nuage de points**.



### **Définitions**

• La **covariance** empirique des séries x et y est donnée par

$$Cov(x,y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x}) (y_i - \overline{y}).$$

• Le coefficient de **corrélation** empirique *(de Pearson)* est alors

$$\rho(x,y) = \frac{Cov(x,y)}{\sigma(x)\sigma(y)}.$$

### Remarque

On a en particulier Cov(x, x) = V(x) et  $\rho(x, x) = 1$ .

### **Propriétés**

- On a Cov(x, y) = Cov(y, x) et  $\rho(x, y) = \rho(y, x)$ .
- On a  $-1 \le \rho(x, y) \le 1$ .
- On a  $|\rho(x,y)| = 1$  ssi il existe deux réels a et b tels que

$$y_i = ax_i + b, \ \forall i \in \{1,\ldots,n\}.$$


 Le coefficient de corrélation est invariant par transformation linéaire (changement d'échelle), i.e. si

$$\forall i \in \{1, \ldots n\}, \ \widetilde{\mathbf{x}}_i = \alpha \mathbf{x}_i + \beta,$$

alors 
$$\rho(\widetilde{x}, y) = \rho(x, y)$$
.

Le jeu de données airquality disponible sur R est constitué des mesures d'ozone, de radiation solaire, de vent et de température prises pendant 153 jours.


	Ozone	Solar.R	Wind	Temp
1	41	190	7.40	67
2	36	118	8.00	72
3	12	149	12.60	74
_4	18	313	11.50	62



### **Exemple (suite)**

### On peut écrire la matrice de corrélation :


$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0.348 & -0.602 & 0.698 \\ 0.348 & 1 & -0.057 & 0.276 \\ -0.602 & -0.057 & 1 & -0.458 \\ 0.698 & 0.276 & -0.458 & 1 \end{pmatrix}.$$



## 5.2 Lien entre une variable qualitative et

une variable quantitative


- On considère une variable x qualitative prenant K modalité, et une variable quantitative y de moyenne  $\overline{y}$  et de variance V(y), dans un échantillon de taille n.
- **\$\psi\_k** Pour chaque modalité  $k \in \{1, ..., K\}$ , on note :
  - $n_k$  l'effectif de la modalité k;
  - $\overline{y}_k$  la moyenne de la variable y pour les individus appartenant au groupe k;
  - $V_k(y)$  la variance de la variable y pour les individus appartenant au groupe k.



Considérons le jeu de donnée iris dans R, contenant 150 observations de fleurs.

Obs	Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Species
1	5.10	3.50	1.40	0.20	setosa
2	4.90	3.00	1.40	0.20	setosa
51	7.00	3.20	4.70	1.40	versicolor
107	4.90	2.50	4.50	1.70	virginica

On peut représenter la distribution de la variable Petal.Length en fonction de l'espèce sur un même graphique.



### **Définitions**

On appelle variance inter-groupes

$$V_{inter} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{K} n_k (\overline{y}_k - \overline{y})^2.$$

On appelle variance intra-groupes


$$V_{intra} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{K} n_k V_k(y).$$

### Décomposition de la variance

On a la formule de König-Huygens

$$V(y) = V_{intra} + V_{inter}$$
.

 $\bigcirc$  Schéma :  $V(y) = V_{intra} + V_{inter}$ .



### Variance expliquée

La proportion de variance de y expliquée par la variable x est  $\frac{V_{inter}}{V(y)}$ 

• Toujours avec le jeu de données iris dans R, on a pour la variable y = Petal.Length:

$$\overline{y} = 3.758$$
,  $\overline{y}_{setosa} = 1.462$ ,  $\overline{y}_{versicolor} = 4.260$ ,  $\overline{y}_{virginica} = 5.552$ 

et

$$V(y) = 3.096$$
,  $V_{setosa}(y) = 0.030$ ,  $V_{versicolor}(y) = 0.219$ ,  $V_{virginica}(y) = 0.303$ .

On calcule la variance intra-groupes :

$$V_{intra} = \frac{1}{150} \times (50 \times 0.03 + 50 \times 50 \times 0.303) = 0.184,$$

et on en déduit la variance inter-groupes :

$$V_{inter} = V(y) - V_{intra} = 2.912.$$

La proportion de variance de Petal.Length expliquée par la variable Espèce est donc de :

$$\frac{V_{inter}}{V(y)} \approx 0.941.$$

## 5.3 Lien entre deux variables qualitatives

- $\diamondsuit$  On considère deux variables qualitatives x et y prenant respectivement J et K modalités, pour un échantillon de taille n.
- On présente généralement ces données sous la forme d'une table de contingence.


Supposons que l'on ait mené une enquête auprès de 100 personnes sur leur boisson préférée, selon la tranche d'âge.

X	Café	Thé	Jus de fruit	Total
Jeunes	5	15	20	40
Seniors	20	25	15	60
Total	25	40	35	100

- On a ici J = 2 et K = 3.
- Pour  $1 \le j \le J$  et  $1 \le k \le K$ , on note :
  - o  $n_{i,k}$  le nombre d'individus satisfaisant à la fois x = j et y = k;
  - o  $n_{i,j}$  le nombre d'individus satisfaisant x = j (effectif ligne j);
  - o  $n_{\cdot,k}$  le nombre d'individus satisfaisant y = k (effectif colonne k).

• Ici,  $n_{2,1} = 20$ ,  $n_{2,\cdot} = 60$  et  $n_{\cdot,1} = 25$ .

On peut représenter un tel tableau par un diagramme en barres :



### **Définition**


- On appelle tableau des **profils-lignes** le tableau des fréquences conditionnelles  $\frac{n_{j,k}}{n_{j,\cdot}}$  (chaque ligne somme à 1);
- On appelle tableau des **profils-colonnes** le tableau des fréquences conditionnelles  $\frac{n_{j,k}}{n_{i,k}}$  (chaque colonne somme à 1).


### **Exemple**

Dans l'exemple précédent, le tableau des profils-lignes est donné par

	Café	Thé	Jus de fruit
Jeunes	$\frac{5}{40} = 0.125$	$\frac{15}{40} = 0.375$	$\frac{20}{40} = 0.5$
Seniors	$\frac{20}{60} = 1/3$	$\frac{25}{60} = 5/12$	$\frac{15}{60} = 1/4$

On peut représenter ce tableau par un diagramme en barres :





 $\mathbb{Q}$  Intuitivement, les variables x et y sont **indépendantes** si les profils-lignes *(et les profils-colonnes)* sont identiques :

$$\forall k \in \{1, \dots, K\}, \ \frac{n_{1,k}}{n_{1,\cdot}} = \frac{n_{2,k}}{n_{2,\cdot}} = \dots = \frac{n_{J,k}}{n_{J,\cdot}}$$
$$\Longrightarrow \forall j \in \{1, \dots, J\}, \ \forall k \in \{1, \dots, K\}, \ \frac{n_{j,k}}{n_{i,\cdot}} = \frac{n_{.,k}}{n}.$$

Q L'indépendance empirique des variables x et y se traduit donc par

$$\forall j \in \{1,\ldots,J\}, \ \forall k \in \{1,\ldots,K\}, \ n_{j,k} = \frac{n_{\cdot,k}n_{j,\cdot}}{n}.$$

### $\chi^2$ d'écart à l'indépendance

On appelle lien du  $\chi^2$  entre les variables x et y l'indice positif

$$\chi^{2} = \sum_{j=1}^{J} \sum_{k=1}^{K} \frac{\left(n_{j,k} - \frac{n_{.,k}n_{j,.}}{n}\right)^{2}}{\frac{n_{.,k}n_{j,.}}{n}}.$$

### Remarque

- La valeur du  $\chi^2$  est nulle dans le cas d'indépendance empirique.
- Quelle est la borne supérieure de cet indice?

### **Propriété**

On a

$$\chi^2 \leqslant n \times \min(J-1,K-1)$$
.

### Lien entre les deux variables

On peut mesurer le lien entre les variables x et y avec la proportion

$$\frac{\chi^2}{n \times \min(J-1, K-1)}.$$

Reprenons l'exemple des boissons.

X	Café	Thé	Jus de fruit	Total
Jeunes	5	15	20	40
Seniors	20	25	15	60
Total	25	40	35	100

On a ici

$$\chi^2 = \frac{(5 - 40 \times 25/100)^2}{40 \times 25/100} + \dots + \frac{(15 - 60 \times 35/100)^2}{60 \times 35/100} \approx 32.5$$

et la proportion de lien des deux variables est donnée par

$$\frac{\chi^2}{100}\approx 0.325.$$

### A retenir

- Représentations graphiques (variable qualitative, variables quantitative).
- Indicateurs statistiques pour une variable quantitative (de position, de dispersion, détermination d'outliers).
- Lien entre variables quantitatives (coefficient de corrélation).
- Lien entre une variable quantitative et une variable qualitative (décomposition de la variance).
- Lien entre deux variables qualitatives (profils lignes/colonnes, coefficient du  $\chi^2$ ).